



Behandeling van Obsessief Compulsieve Stoornis bij kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Voorlopige resultaten van een systematische review.



Sigrid Piening, PhD,¹ Wiljo J.P.J. van Hout, PhD,^{2,3} Leonie Kreuze, BSc,³
 Leonieke J.J. Vet, MSc,² Menno D. Oosterhoff, MD,^{1,2} Inge D.C. van Balkom, MD, PhD.¹

¹ Jonx|Lentis, Autisme Team Noord Nederland; ² Jonx|Lentis, Polikliniek voor dwangstoornissen; ³ RuG, Klinische Psychologie.

Doel

Een overzicht verkrijgen van de effectiviteit van de huidige behandelmethoden voor OCS bij patiënten met ASS en mogelijke factoren die de behandeling kunnen faciliteren of belemmeren.



Achtergrond

Obsessieve compulsieve stoornissen (OCS) ofwel dwangstoornissen (**Fig. 1**) komen frequent voor en vormen een grote belemmering in het dagelijks leven. Er is steeds meer bewijs dat OCS ook samen met autisme kan voorkomen.^{1,2} Er is weinig bekend over de effectiviteit van behandeling van ASS patiënten met comorbide OCS. Ook is onduidelijk of factoren als motivatie en visuele ondersteuning een faciliterende of belemmerende invloed hebben op de behandeling. Met deze kennis kan de huidige behandeling van OCS bij patiënten met ASS geoptimaliseerd worden, wat de kwaliteit van leven van de patiënten ten goede kan komen.




Fig. 1

Methode

Design: systematisch literatuuronderzoek naar effectiviteit van behandeling van OCS bij patiënten met ASS. **Inclusie:** artikelen in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands. **Exclusie:** opinie artikelen, cross-sectionele studies en publicaties over niet-originele data. **Werkwijze:** een gestandaardiseerd dataextractie-formulier voor variabelen als: publicatie jaartal, land, studieopzet, behandelmethode, uitkomstmaat, kwaliteit van de studie, behandel-effect, faciliterende en belemmerende factoren voor succesvolle behandeling. Selectie van artikelen en data extractie door twee onafhankelijke onderzoekers. Bij discrepanties consensus in overleg met een derde onderzoeker. **Data-analyse:** beschrijvend.

Voorlopige resultaten

Totaal werden 1587 artikelen geïdentificeerd. Na titel- en abstractselectie beoordeling van volledige inhoud van 74 artikelen. Drie studies naar het effect van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) werden unaniem geïnccludeerd. De studies (UK en Australië; 2008-2013) rapporteerden positieve effecten van CGT op OCS symptomen.

Conclusie

Nadere analyses volgen.

Contact: E-mail: s.piening@lentis.nl Tel: 050-5223299

Literatuur

¹ Bejerot, S., Ekselius, L., Van Knorring, L. 1998. Comorbidity between obsessive-compulsive disorder (OCD) and personality disorders. Acta Psychiatr Scand 97(6) :398-402.

² Gillberg C, Billstedt E. 2000. Autism and Asperger syndrome: coexistence with other clinical disorders. Acta Psychiatr Scand. 102(5):321-30.